

# ESCALA PARA VALORACIÓN DE TRASTORNOS DE CONDUCTA. «COHEN-MANSFIELD AGITATION INVENTORY» (1989)

Vestimenta inadecuada o desnudarse	
Escupir (incluido comida)	
Maldecir o tener agresividad verbal	
Demanda continua e injustificada de atención o ayuda	
Frases o preguntas repetitivas	
Pegar, incluso a uno mismo	
Dar patadas	
Agarrar a las personas	
Dar empujones	
Lanzar objetos	
Hacer ruidos raros (risa o llanto extraños)	
Gritar	
Morder	
Arañar	
Tratar de irse a otro sitio (vgr. salir a la calle)	
Caída intencionada	
Estar quejándose	
Negativismo	
Comer o beber cosas no comestibles	
Hacerse daño a uno mismo o a los demás	
Manejo inadecuado de cosas	
Esconder cosas	
Acumular cosas	
Romper cosas o destruir sus propias pertenencias	
Repetir movimientos estereotipados	
Realizar insinuaciones sexuales de tipo verbal	
Realizar insinuaciones sexuales de tipo físico	
Inquietud general	

La frecuencia de las conductas de las dos últimas semanas son registradas en base a una escala de puntuación hasta 7: 1 = nunca; 2 = menos de 1 vez/semana; 3 = 1 ó 2 veces/semana; 4 = varias veces/semana; 5 = 1 ó 2 veces/día; 6 = varias veces/día; 7 = varias veces/hora.